

WICHTIG!

IMPORTANT!

VOR + NACH MANDEL- UND NASEN-OPERATIONEN:

SCHMERZEN - NUR PARACETAMOL UND NOVALGIN ERLAUBT!
--

ACHTUNG:

Nach Mandel- und Nasenoperationen sind die Wunden erst nach 3 Wochen verheilt. In dieser Zeit kommen gelegentlich Nachblutungen vor (siehe Aufklärungsblätter).

Viele Schmerzmittel verdünnen das Blut, so dass die Einnahme von nicht erlaubten Schmerzmitteln Nachblutungen auslösen oder begünstigen kann.

VERBOTEN SIND:

- 3 Wochen vor und bis 4 Wochen nach Operation:

Alle Medikamente, die **Acetylsalicylsäure** (ASS) enthalten (z.B. Aspirin[®], ASS+C[®], Alca C[®], Alcacyl[®], Alka Seltzer[®]). Lesen sie unbedingt auf dem Beipackzettel, ob allenfalls ASS ein Bestandteil ist. Viele nichtrezeptpflichtige Migräne-/ Schnupfen- / Grippe- / Schmerzmittel beinhalten ASS.

ASS hemmt dauerhaft die Thrombozytenfunktion und führt zu Nachblutungen.

- 3 Tage vor und bis 3 Wochen nach Operation:

Alle **nichtsteroidalen Antiphlogistika** wie:

- **Ibuprofen** (Algifor[®])
- **Diclofenac** (Voltaren[®])
- **Mefenaminsäure** (Ponstan[®], Mefenacid[®])
- weitere hier nicht genannten

Diese Medikamente hemmen kurzzeitig die Thrombozytenfunktion und verlängern so die Blutungszeit. Auch sie könnten zu vermehrten Nachblutungen führen.

- Informieren Sie uns vor der Operation über eine allfällige Einnahme von **pflanzlichen Präparaten** wie z.B. **Umckaloabo**[®]. Auch solche Medikamente sind allenfalls starke Gerinnungshemmer!

- Akzeptieren Sie solche Medikamente NICHT, falls man Ihnen solche vor der Operation oder während der Wundheilungszeit anderswo anbietet!

ERLAUBT:

Paracetamol (z.B. Dafalgan[®]) oder Metamizol (Novalgin[®]). Die Dosis legt der Arzt fest. Geben Sie uns Bescheid, falls bei Ihnen eine Leberfunktionsstörung bekannt ist!